



FAKULTET ZA BIOFARMING

Tehnologija proizvodnje konoplje

17.12.2011.

ISTORIJA GAJENJA KONOPLJE

Konoplja spada među biljke koje je čovek najranije odomaćio. Istorijat njenog gajenja dug je više od 6.000 godina .

U periodu najintenzivnijeg gajenja konoplje svetske površine su iznosile blizu milionhektara. Jugoslavija je 1948. godine prema podacima FAO, sa površinama pod konopljombila najznačajniji proizvođač u Evropi (ne računajući SSSR) sa udelom od oko 25 % u evropskim i 6 % u svetskim razmerama.

Prvi znaci krize svetskog konopljarstva javljaju se početkom XX veka, a značajan pad proizvodnje bio je posledica korišćenja vlakana drugih biljaka, a posebno veštačkihvlakana. Smanjenje površina pod konopljom u Vojvodini odraz su promena u potražnji.

U odnosu na period od pre 1968. godine, kada je konoplja u Vojvodini gajena na 20-21.000 ha, u dvadesetogodišnjem periodu 1967-1987. površine su se smanjile za oko 80 %i ustalile na nivou 2-4.000 ha godišnje. Počev od 1988. godine uočava se ponovno naglosmanjenje za oko 80 %, na blizu 1.000 ha godišnje, što je zadržano i do danas.

Poslednjih godina dešava se svojevrsna renesansa konoplje u svetskim razmerama. Vraćanje prirodnim, biorazgradivim sirovinama dovelo je do postepenog povećanja površina pod konopljom. U tom kontekstu raste interesovanje za konopljom i u našojzemlji.

Morfologija konoplje

Dugo prisustvo konoplje pod vrlo različitim agroekološkim uslovima i na širokom

geografskom prostoru dovelo je do nastanka znatne varijabilnosti kvalitativnih i kvantitativnih svojstava konoplje.

Za konoplju je karakterističan izraženi polni dimorfizam, sl. 1. Muške biljke se unarodu nazivaju "belojke", a ženske su nazvane "crnojke".

----- CEO RAD MOŽETE PREUZETI NA SAJTU -----

<http://www.maturskiradovi.net/eshop/>

**POGLEDAJTE VIDEO UPUTSTVO SA TE STRANICE
I PORUČITE RAD PUTEŠ ESHOPA ,
REGISTRACIJA JE OBAVEZNA.**

MOŽETE NAS KONTAKTIRATI NA E-MAIL:

maturskiradovi.net@gmail.com